NOTE XVIII.

DESCRIPTION DE CINQ ESPÈCES D'ÉLATÉRIDES NOUVEAUX DU MUSÉE DE LEYDE

PAR

E. CANDÈZE.

1. *Monocrepidius insularis*, sp. n.

(♂). *Depressus, oblongo-ovalis, brunneus, griseo-pubescens; prothorace latitudini longitudine æquali, crebre punctato, angulis posticis brevibus, translucido-pallidioribus, haud divaricatis, breviter carinatis; elytris thoracis vix latitudine, punctato-striatis, interstitiis rugulosis, pedibus testaceis.* — Long. $7^1/_2$ mill., lat. 2 mill.

(♀). *Major, nitidior, antennis multo brevioribus.*

Hab. Insula Bintang (Archipel de Riouw).

Un exemplaire de chacun des sexes trouvé par M. A. L. van Hasselt.

2. *Monocrepidius carinifrons*, sp. n.

Brunneus, dense pubescens; fronte longitrorsum valde carinata; prothorace sat fortiter punctato, punctis laterum umbilicatis, basi flavo; elytris punctato-striatis, basi flavo-tinctis; pedibus flavis. — Long. 6 mill., lat. 2 mill.

Hab. Indragiri: Sumatra orient.

Espèce facilement reconnaissable à la forte carène longitudinale, qui divise le front.

Un exemplaire mâle trouvé par M. A. L. van Hasselt.

3. *Megapenthes variatus*, sp. n.

Niger, opacus, pubescens; fronte margine antico flavo; prothorace latitudine haud longiore, crebre punctato, basi

late flavo, angulis posticis haud divaricatis, unicarinatis; elytris punctato-striatis, flavo-variegatis; pedibus flavis. — Long. 7 mill., lat. 2 mill.

Hab. Insula Bintang (Archipel de Riouw).

Voisin des *M. sexmaculatus* et *musivatus*. Les élytres portent sur un fond jaune une grande tache cruciale commune noire, constituée par la suture et une fascie médiane de cette couleur. Les épaules sont également noires.

Un exemplaire trouvé par M. A. L. van Hasselt.

4. *Megapenthes seriatus*, sp. n.

Elongatus, brunneus, griseo-pubescens; prothorace latitudine longiore, punctato, basi tantum sulcato, angulis posticis bicarinatis; elytris punctato-striatis, interstitiis paribus densius pilosis. — Long. 12 mill., lat. 3 mill.

Hab. Padang (Deli): Sumatra orient.

La pubescence grise, plus dense sur les intervalles pairs des stries des élytres, donne à celles-ci un aspect rayé tout à fait caractéristique.

Un exemplaire trouvé par M. E. Büttikofer.

5. *Diploconus elateropsis*, sp. n.

Niger, parum nitidus, depressus, fulvo-pilosulus; prothorace punctis umbilicatis notato, rufo, linea media impressa nigricante; elytris fortiter punctato-striatis, interstitiis convexis, rugosis, apice integris; subtus nitidior, pedibus nigris. — Long. 9 mill., lat. 2 mill.

Hab. Insula Natuna (Mer de Chine).

Plusieurs *Diploconus* sont colorés de la même manière, noir à corselet rouge. Celui-ci se distingue par son aspect moins luisant et surtout par la ligne noire qui couvre le sillon médian du prothorax.

Un exemplaire trouvé par M. A. L. van Hasselt.

Glain-lez-Liège, Juin 1896.